Image not found or type unknown

Rédaction le 25 septembre 2019.

Dernière mise à jour le 25 septembre 2019

Lien vers l'article:

https://infosante.be/guides/fracture-du-pnis

Fracture du pénis

Une fracture du pénis, qu'est-ce que c'est ?

Une fracture du pénis est une rupture de la 'tunique' (couche de tissu conjonctif) qui enveloppe les corps caverneux à l'intérieur du pénis. Le pénis se compose de 3 corps caverneux. Le pénis entre en érection lorsque ceux-ci se gorgent de sang. Deux de ces corps caverneux sont enveloppés d'une solide couche de tissu conjonctif, qui maintient le sang dans les corps caverneux. Si cette couche de tissu conjonctif se rompt, le sang s'écoule des corps caverneux vers d'autres parties du pénis. L'érection disparaît et le pénis prend une coloration bleu-violet.

La cause la plus fréquente de fracture du pénis est une torsion du pénis pendant un rapport sexuel. La position la plus risquée au moment de la pénétration est celle où la personne qui reçoit la pénétration se trouve au-dessus de la personne qui pénètre. D'autres causes possibles sont une masturbation trop énergique ou le simple fait de se retourner dans son lit. Les fractures du pénis en l'absence d'érection sont très rares.

À quelle fréquence ?

La fracture du pénis est très rare. Les lésions du pénis moins graves, avec contusion mais sans véritable fracture, sont plus fréquentes.

Comment reconnaître une fracture du pénis ?

La rupture du tissu conjonctif provoque le plus souvent un bruit de craquement. Ensuite, l'érection disparaît instantanément et une douleur sévère apparaît, accompagnée d'une coloration bleu-violet et d'un gonflement du pénis. Parfois, le pénis peut présenter une déformation (courbure).

Dans de rares cas, la facture s'accompagne aussi d'une lésion au niveau de l'urètre. Vous éprouvez alors des difficultés à uriner et vous avez du sang dans les urines.

Comment le diagnostic de la fracture du pénis est-il posé ?

Votre médecin vous posera des questions, notamment sur la perte soudaine d'érection, le bruit de craquement, la présence de sang dans les urines, les difficultés à uriner, …

Il ou elle examinera ensuite le pénis et en évaluera le gonflement, la contusion et l'éventuelle courbure. Si le diagnostic est clair après la discussion et l'examen clinique, il n'est pas nécessaire de faire d'autres examens.

Si votre médecin a des doutes sur le diagnostic, il ou elle vous proposera une échographie, un CT scan ou une IRM (imagerie à résonance magnétique).

Que pouvez-vous faire ?

Une fracture du pénis est un cas d'urgence : vous devez consulter un ou une médecin au plus vite. Après confirmation du diagnostic, le ou la médecin généraliste vous orientera vers un ou une urologue ou un service d'urgences. En raison de la nature embarrassante de la lésion, bon nombre de personnes tardent souvent à consulter. Or, une aide médicale urgente est indispensable et il n'y a pas de quoi avoir honte.

Que peut faire votre médecin ?

En cas de fracture du pénis avec torsion, une intervention chirurgicale s'impose d'urgence. L'urologue suturera la déchirure dans la couche de tissu conjonctif qui enveloppe les corps caverneux.

Après l'opération, presque tout le monde retrouve une sexualité normale.

Rédaction le 25 septembre 2019.

Dernière mise à jour le 25 septembre 2019

Lien vers l'article:

https://infosante.be/guides/fracture-du-pnis

Liens Utiles

- L'IRM, ici, https://www.saintluc.be/brochures-information-patients/brochures/commu-dsq-125-1.0-irm.pdf
- Le scanner, ici, https://www.saintluc.be/brochures-information-patients/brochures/commu-dsq-124-1.0-scanner.pdf

Sources

- Guide de pratique clinique étranger https://www.ebpnet.be/nl/pages/display.aspx?ebmid=ebm01143