

Lien vers l'article:

[https://infosante.be/guides/
steatose-hepatique-non-
alcoolique](https://infosante.be/guides/steatose-hepatique-non-alcoolique)



Stéatose hépatique non alcoolique

La stéatose hépatique non alcoolique, qu'est-ce que c'est ?

Stéatose hépatique non alcoolique

Une stéatose hépatique est une maladie du foie caractérisée par une accumulation de graisses dans le foie. Le foie devient gras. Certains médecins vous diront d'ailleurs que vous avez un « foie gras ».

Quand on dit que la stéatose hépatique est « non alcoolique », cela veut dire que le foie n'est pas abîmé par une consommation excessive d'alcool.

La stéatose hépatique non alcoolique est fortement liée au [syndrome métabolique](#).

Syndrome métabolique

Une personne qui est atteinte d'un syndrome métabolique accumule plusieurs problèmes de santé :

- un [dérèglement du taux de sucre dans le sang \(glycémie\)](#) ;
- un [taux élevé de cholestérol dans le sang](#) ;
- une [tension artérielle élevée \(hypertension\)](#) ;
- une [obésité](#).

Ce problème est surtout causée par des mauvaises habitudes alimentaires et un manque d'activité physique.

Stéato-hépatite

Quand des cellules du foie sont abîmées par la maladie du foie gras (stéatose hépatique), on parle de **stéato-hépatite**. Il est important que le médecin détecte cette complication à temps, car elle peut évoluer en [cirrhose du foie](#) ou en [cancer du foie](#).

Quelle est la fréquence de la stéatose hépatique non alcoolique ?

La stéatose hépatique non alcoolique est la maladie du foie la plus fréquente dans les pays occidentaux. Chez les personnes âgées de 45 à 69 ans, lorsque les résultats sanguins des tests hépatiques sont élevés, c'est souvent en lien avec une stéatose hépatique non alcoolique.

Environ 1 personne atteinte de stéatose hépatique sur 20 souffre aussi de stéato-hépatite.

Comment reconnaître une stéatose hépatique non alcoolique ?

Il est difficile pour une personne de penser qu'elle pourrait avoir une maladie au foie. En effet, elle n'a généralement aucun symptôme.

Comment le diagnostic de stéatose hépatique non alcoolique est-il posé ?

La stéatose hépatique non alcoolique est souvent découverte par hasard :

- dans les résultats d'une prise de sang ;
- pendant une [échographie](#) ou un autre examen d'imagerie du ventre.

Discussion

Le médecin vous pose des questions sur votre consommation d'alcool pour exclure une cause alcoolique à la stéatose hépatique. On considère que la [consommation d'alcool est problématique](#) pour le foie si, pendant au moins 1 an,

- un homme boit plus de 3 verres d'alcool par jour ;
- une femme boit plus de 2 verres d'alcool par jour.

La consommation est dite problématique parce que ce niveau de consommation est important et qu'il peut provoquer des maladies ou des problèmes dans la vie de tous les jours (vie sociale et professionnelle par exemple).

Examens

En plus de cette discussion, votre médecin peut demander une prise de sang. Sur base des résultats, votre médecin peut :

- savoir si une infection ([hépatite virale](#)) ou une [maladie auto-immune du foie](#) est présente ;
- évaluer le risque de [syndrome métabolique](#), de [diabète](#) et de stéato-hépatite.

Pour savoir si la stéatose hépatique est devenue une stéato-hépatite non alcoolique, votre médecin peut demander une **biopsie du foie**. Il peut ainsi vérifier s'il y a une accumulation de graisse et si des cellules du foie sont très abîmées (nécrosées).

En effet, si trop de cellules du foie sont nécrosées, des cicatrices se forment sur la paroi du foie : ce processus s'appelle la fibrose. Ces endroits fibrosés sont moins élastiques que les endroits où les cellules sont normales.

Certains examens de laboratoires, une imagerie par résonance magnétique (IRM ou RMN) du foie ou un fibroscan (un examen qui ressemble à une échographie), permettent de mesurer l'élasticité du foie pour évaluer son degré de fibrose. Quand la fibrose du foie est très importante, la personne risque d'avoir une cirrhose du foie.

Que pouvez-vous faire ?

Si vous souffrez de stéatose hépatique non alcoolique ou de syndrome métabolique, il est très important d'[adapter votre mode de vie](#). Voici quelques habitudes que pourriez prendre :

- essayez de perdre 10 % de votre poids chaque année jusqu'à atteindre un [IMC inférieur à 25](#) ;
- essayez d'éviter les sucres, surtout raffinés, c'est-à-dire les sucres que l'on trouve dans les sodas et les sucreries en général ;
- essayez de pratiquer une activité physique suffisante, par exemple 30 minutes par jour ;

- évitez l'alcool, les drogues, ainsi que les médicaments ou produits naturels toxiques pour le foie.

Que peut faire votre médecin ?

Conseils nutritionnels et accompagnement

Votre médecin peut vous donner des conseils pour manger plus sain.

Il peut aussi vous orienter vers un diététicien ou un médecin nutritionniste qui vous aidera à mieux manger et perdre du poids.

Orientation vers le spécialiste

S'il pense que vous avez peut-être une stéato-hépatite, votre médecin vous orientera vers un spécialiste du système gastro-intestinal (gastro-entérologue) pour des examens complémentaires.

Pas de date de publication.

Dernière mise à jour le 21
septembre 2020

Lien vers l'article:

[https://infosante.be/guides/
steatose-hepatique-non-
alcoolique](https://infosante.be/guides/steatose-hepatique-non-alcoolique)

